

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

Presidente Drouard

Tamaño: Muy variable, desde mediana a muy grande.

Forma: Piriforme, turbinada u ovoide. Cuello poco marcado. Asimétrica. Superficie irregular con depresiones y protuberancias sin localización fija. Contorno irregular, a veces fuertemente ondulado.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda o nula. Generalmente oblicua, con el borde ondulado o mamelonado. **Pedúnculo:** Medio o corto. Fino, fuerte, leñoso, algo engrosado en los extremos. Parcial o totalmente verde. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo.

Cavidad del ojo: Anchura y profundidad variables. Muy irregular con borde ondulado o mamelonado. **Ojo:** Pequeño o medio. Abierto, sépalos cóncavos y erectos con las puntas rotas o rizadas hacia fuera.

Piel: Áspera, finamente granulosa, seca, mate, apergaminada. **Color:** Verde o amarillo-dorado, sin chapa o leve chapa cobriza o sonrosada. Punteado abundante, muy menudo, poco visible, verdoso o ruginoso.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto.

Corazón: Pequeño, fusiforme o redondeado. Eje estrecho, cerrado o abierto. Celdillas amplias.

Semillas: Grandes, alargadas. Con iniciación de espolón. Color castaño amarillento o rojizo con salientes más oscuros.

Carne: Blanca o blanco amarillenta. Semi-fundente, algo granulosa, jugosa. **Sabor:** Azucarado, acidulado, perfumado. Bueno.

Maduración: Invierno.

